


Bijlage 2. Overige voorkomens van buitendijkse vegetatie in de Westerschelde.


Bijlage 2a. Kleine gebieden langs de hele Westerschelde.



Bijlage 2b. Globale vegetatiekaart Platen van Valkenisse (1989; D J de Jong).

Beschrijving vegetatie.

De vegetatie op de Platen van Valkenisse is geconcentreerd op het oostelijk deel van de grote plaat. De dichtste vegetatie (totale bedekking ca 20%) is geconcentreerd op een hoge rug aan de noordzijde van de plaat, met uitlopers met een ijlere begroeiing naar het westen, zuiden en oosten. De overheersende soort is *Spartina anglica*, met plaatselijk *Salicornia europaea* en *Aster tripolium*. De vegetatie is nog jong, maar gezien de grootte van de spartina-pollen al wel 5 - 7 jaar oud (grootste pollen ca 7 -10 m doorsnede).



Globale vegetatiekaart Platen van Valkenisse (1989; D J de Jong)

Legenda

- type 1: Spartinapollen  $\leq 1\%$ ; pollen tot  $\pm 7$ m diameter; in meest oostelijke gebied met enige Asterplanten
- type 2: Spartinapollen + Aster, totale bedekking  $20\%$ ; *Spartina anglica*  $20\%$ , *Aster tripolium*  $2\%$ ; pollen tot  $10$ m diameter, plaatselijk aaneensluitend; eerste kreekaanzetten.
- type 3: Aster + *Salicornia* + *Spartina*, totale bedekking  $1\%$ ; *Aster tripolium*  $1\%$ , *Salicornia europaea* en *Spartina anglica*  $< 1\%$ .
- Verder komen er in het gehele oostelijke plaatgebied verspreid *Spartina*-planten (één tot enkele jaren oud) voor.



### Bijlage 3. Gebiedslegenda's buitendijkse gebieden Westerschelde.

#### Toelichting:

In deze bijlage zijn de gebiedslegenda's opgenomen van alle gekarteerde gebieden. De cijfers voor de legenda-eenheden hebben betrekking op de cijfers in de kaartvlakken van de desbetreffende gebieden.

In sommige legenda's staan de cijfers niet alle in numerieke volgorde, en/of er ontbreken een of meerdere cijfers. Dit is het gevolg van het verdwijnen of samenvoegen van kaartvlakken van de oorspronkelijke vegetatiekaarten van de Meetkundige Dienst ten behoeve van de verkleinde kleurenkaarten.

# 1 Rammekenshoek

- 2/3. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor en natte slibrijke, maar ook zandige delen van slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
- 4/7/8.  
Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeekraal, Zeeaster en Schorrekruid  
Lage schorrand, lage natte kommen en in krekken en in krekken  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Salicornia europaea*,  
*Aster tripolium* en *Suaeda maritima*
5. Gemeenschap van Zeekraal  
Hoge delen van het slik  
*Salicornietum strictae* Christiansen 1955
6. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeekraal  
Slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
9. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeekraal, Zeeaster en Schorrekruid, overgang naar de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Lage, natte, beweide kommen  
Overgang tussen *Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Salicornia europaea*, *Aster tripolium* en *Suaeda maritima* en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
11. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Schorrezoutgras  
Hoge kommen op beweid schor  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Triglochin maritima*
12. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Lamsoor  
Hoge kommen op extensief beweid schor  
*Puccinellietum maritimae typicum*, variant met *Limonium vulgare* Beeftink 1962
14. Gemeenschap van Gewone zoutmelde  
Schorrand, goed ontwaterde achterduinse strandvlakte en langs dijk  
*Halimionetum portulacoidis* Kuhnholz-Lordat 1927
16. Gemeenschap van Schorrekruid  
Overgangszone slik naar opgespoten terrein, voor en langs hoge dammen (antropogeen)  
*Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953
18. Gemeenschap van Zeeaster  
Lage, vochtige plekken langs dijk waar enig vloedmerk wordt gedeponeed  
*Aster tripolium-sociatie* Beeftink 1965
21. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelle  
Schorrand, hoge schordelen en opgespoten terrein, hoge dam (antropogeen), langs dijkvoet en brakke duinvlakten  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962

21. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde  
Schorrand, hoge schordelen en opgespoten terrein, hoge dam (antropo-  
geen), langs dijkvoet en brakke duinvlakten  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
22. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde met Akkerdistel  
Hoge dam op schor, hooggelegen opgespoten terrein, dijkvoet en duin-  
gebied langs beweide gedeelte  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met  
*Cirsium arvense*
23. Mozaïek van de gemeenschap van Schorrekruid en de gemeenschap van  
Spiesmelde en Strandkweek met Akkerdistel  
*Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953 en *Atriplici-Agrophyretum*  
*pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Cirsium arvense*
24. Gemeenschap behorende tot het Loogkruidverbond  
Strook relatief hoog strand (embryonale duinvorming)  
*Salsolo-Honkenyon peploidis* R.Tüxen 1950
25. Gemeenschap behorende tot het Loogkruidverbond overgang naar de gemeen-  
schap van Helm en Zandhaver met Rood zwenkgras  
Plaatsen met duinvorming  
*Salsolo-Honkenyon peploidis* R.Tx. 1950, overgang naar  
*Elymo-Ammophiletum, subass.festucetosum* R.Tx. 1937
- 26/27.  
Duinvegetatie met Zandhaver, Helm en Rood zwenkgras  
Duinhellingen en duinvalleien  
*Elymo-Ammophiletum, subass.festucetosum* R.Tüxen 1937
- 28/29.  
Duindoorn-Vlierstruweel (eventueel met aangeplante wilg)  
Duinhellingen en duinvalleien  
*Hippophao-Sambucetum* Boerboom 1960
31. Beemdgras-Raaigrasweide  
Intensief beweide grasland  
*Poo-Lolietum* D.M.de Vries et Westhoff n.n. apud A.Bakker 1965
- \*\* Klein zee gras (*Zostera noltii*)
- \* Zeebies (*Scirpus maritimus*)
- A Antropogeen, vnl. opgespoten terrein



## 2 Kaloot

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Hoge delen van het slik  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953
2. Gemeenschap van Zeekraal en de gemeenschap van Engels slijkgras  
Komachtig gebied  
**Salicornietum strictae** Christiansen 1955 en **Spartinetum townsendii**  
Corillion 1953
3. Gemeenschap van Zeekraal en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Kom  
**Salicornietum strictae** Christiansen 1955 en **Puccinellietum maritimae**  
**typicum** Westhoff 1947
4. Gemeenschap van Gewone zoutmelde met Zilte rus  
Lage kom  
**Halimionetum portulacoidis** Kuhnholz-Lordat 1927  
met *Juncus gerardii*
5. Gemeenschap van Engels slijkgras met andere soorten zoals Zeekraal,  
Gewoon kweldergras, Zeebies, Riet, Strandkweek, Rood zwenkgras en  
Zilte rus  
Verstoord gebied langs dijkvoet en langs stagnerend binnenwater  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953 met *Salicornia europaea*,  
*Puccinellia maritima*, *Scirpus maritimus*, *Phragmites australis*,  
*Elymus pycnanthus*, *Festuca rubra* en *Juncus gerardii*
6. Gemeenschap van Strandkweek en Spijesmelde o.a. met Rood zwenkgras  
Aan de voet van dijk en duinen  
**Atriplici-Agropyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962 met  
*Festuca rubra*
7. Gemeenschap van Strandkweek en Spijesmelde met Riet  
Dijkvoet en langs stagnerend binnenwater  
**Atriplici-Agropyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962 met  
*Phragmites australis*
8. Gemeenschappen uit het Biestarwegras-verbond met o.a. Strandkweek,  
Akkerdistel, Akkermelkdistel, Zeewinde  
Duinen, stuifduinen en opgespoten terrein  
**Agropyro-Honkenyion peploidis** R.Tx. 1945 apud Br.-Bl. et R. Tx. 1952  
met *Elymus pycnanthus*, *Cirsium arvense*, *Sonchus arvensis*, *Calystegia*  
*soldanella*

### 3 Hooge Platen

1. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeeaster  
Primair schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 met *Aster tripolium*
2. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeeaster en Schorrekruid  
Schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 met *Aster tripolium* en *Salicornia europaea*
3. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeekraal  
Hoog schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
4. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeekraal, Zeeaster en Schorrekruid  
Schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 met *Aster tripolium*, *Salicornia europaea* en *Suaeda maritima*

#### 4 Schor bij Hoofdplaat en

#### 5 Schor voor de Paulinapolder

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor en in krekken  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
2. Gemeenschap van Engels slijkgras overgang naar de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Lage schorrand en lage (natte) kommen  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, overgang naar het *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
3. Gemeenschap van Engels slijkgras overgang naar de gemeenschap van Zeekraal  
Hogere delen van het slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, overgang naar het *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
4. Gemeenschap van Zeekraal  
Hogere delen van het slik  
*Salicornietum strictae* Christiansen 1955
5. Gemeenschap van Zeekraal overgang naar de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Hoogste delen van het slik, geërodeerde schorrand en lage schorrand  
*Salicornietum strictae* Christiansen 1955 overgang naar het *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
6. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Engels slijkgras  
Lage schorrand en lage kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum*, initiale fase met *Spartina anglica*, Dijkema 1982
7. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde  
Goed ontwaterde kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum*, terminale fase met *Halimione portulacoides*, Beeftink 1962
8. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Lamsoor  
Schorrand  
*Puccinellietum maritimae typicum*, variant met *Limonium vulgare*, Beeftink 1962
9. Gemeenschap van Schorrekruid met langs de dijk een smalle strook van de gemeenschap van Zoutmelde  
Lage kommen, lage kreekranden en lage delen langs de dijkvoet  
*Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953 en *Halimionetum portulacoidis* Kuhnoltz-Lordat 1927

10. Gemeenschap van Gewone zoutmelde overgang naar de gemeenschap van Gewone zoutmelde met Zeealsem  
Schorrand, oeverwallen, hoge delen in de kommen en langs de dijkvoet  
*Halimionetum portulacoidis* en *Halimionetum portulacoidis* Kuhnholz-  
Lordat 1927 terminale fase met *Artemisia maritima*, Beeftink 1959
  11. Gemeenschap van Zeealsem  
Schorrand, oeverwallen en de helling van dammen  
*Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962
  12. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde overgang naar de gemeenschap van Zeealsem  
Schorrand, oeverwallen, dijkvoet en hoge dam (nol)  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, overgang naar het *Artemisietum maritimae* (Hocquette 1927) Br.-Bl. et De Leeuw 1936
  13. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde  
Dijkvoet, ruggen (antropogeen) en hoge dam (nol)  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
- 14/15/16/17  
Gemeenschap van het strand en de duinen overgang naar de gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde  
Opgespoten terreinen voor de dijk
- A Antropogeen, vnl. opgespoten terrein

## 6 Zuidgors

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
2. Gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Primair schor en lage natte kommen  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
3. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeealsem  
Vergraven gebied met hoge bultjes tussen kade  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962
4. Mozaïek van de gemeenschap van Zeekraal en de gemeenschap van Engels slijkgras  
Schorrand  
*Salicornietum strictae* Christiansen 1955 en *Spartinetum townsendii* Corillion 1953
5. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Engels slijkgras en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek  
Vergraven gebied met hoge bultjes  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, met *Spartina anglica* en *Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
6. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Zeekraal  
Extensief beweid gebied langs dijk met stagnerend water  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
7. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Engels slijkgras  
Lage kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Spartinetum townsendii* Corillion 1953
8. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde en de gemeenschap van Engels slijkgras  
Kommen met lage plekken  
*Puccinellietum maritimae typicum*, terminale fase met *Halimione portulacoides* Beeftink en *Spartinetum townsendii* Corillion 1953
9. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde, de gemeenschap van Gewone zoutmelde en de gemeenschap van Gewone zoutmelde met Schorrekruid en Gewoon kweldergras  
Hoge kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum*, terminale fase met *Halimione portulacoides*, *Halimionetum portulacoidis* Kuhnholz-Lordat 1927 en *Halimionetum portulacoidis*, variant met *Suaeda maritima* en *Puccinellia maritima*

10. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met lamsoor en Schorrezoutgras  
 Kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum*, variant met *Limonium vulgare* Beeftink  
 1962
11. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Lamsoor en  
 Schorrezoutgras en de gemeenschap van Engels slijkgras  
 Betreden gebied langs dijk  
*Puccinellietum maritimae typicum*, variant met *Limonium vulgare* Beeftink  
 1962 en *Spartinetum townsendii* Corillion 1953
12. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Schorrekruid en de gemeenschap  
 van Schorrekruid  
 Zone achter schorrand, kommen en voormalig beweide gebied langs dijk  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Suaeda*  
*maritima* en *Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953
13. Gemeenschap van Schorrekruid en langs kreek gemeenschap van Rood  
 zwenkgras  
 Voormalig beweide gebied langs dijk  
*Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953 en langs kreek  
*Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962
14. Mozaïek van de gemeenschap van Gewone zoutmelde en de gemeenschap  
 van Zeekraal  
 Slecht afwaterende vrij hoge kommen  
*Halimionetum portulacoidis* Kuhnoltz-Lordat 1927 en *Salicornietum*  
*strictae* Christiansen 1955
15. Gemeenschap van Gewone zoutmelde met Strandkweek en Rood zwenkgras  
 Hoge kom en vergraven gebied langs dijk  
*Halimionetum portulacoidis* Kuhnoltz-Lordat 1927, variant met *Elymus*  
*pycnanthus* en *Festuca rubra*
16. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek  
 Lage oeverwallen en hoge komdelen  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
17. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek met Gewone zoutmelde en  
 Schorrekruid  
 Hoge oeverwallen  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met  
*Halimione portulacoides* en *Suaeda maritima*
18. Mozaïek van de gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek, de gemeen-  
 schap van Spiesmelde en Strandkweek met Strandmelde of met Rood  
 zwenkgras en de gemeenschap van Zeealsem  
 Hoge oeverwallen, hoge kommen, ruggen en dijkvoet  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, *Atriplici-*  
*Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, met *Atriplex littoralis*  
 en *Festuca rubra* en *Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962
- \* Zeebies (*Scirpus maritimus*)

## 7 Schor bij Baarland

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor en lage kom  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
2. Gemeenschap van Engels slijkgras overgang naar de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Lage kommen, primair schor en gebied langs dijk  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, overgang naar *Puccinellietum maritimae typicum*, facies van *Puccinellia maritima* Beeftink 1962
3. Gemeenschap van Zeekraal overgang naar de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Primair schor  
*Salicornietum strictae* Christiansen 1955 en *Puccinellietum maritimae typicum* facies van *Puccinellia maritima*, Beeftink 1962
4. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Engels slijkgras  
Lage kommen, gebied langs dijk en lage schorrand  
*Puccinellietum maritimae typicum*, initiale fase met *Spartina anglica*, Dijkema 1982
5. Gemeenschap van Gewoon kweldergras overgang naar de gemeenschap Zeekraal  
Kommen en lage schorrand  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, overgang naar *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
6. Gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Kommen, gebied langs dijk, lage schorrand en oeverwal  
*Puccinellietum maritimae typicum*, facies van *Puccinellia maritima* Beeftink 1962
7. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras de gemeenschap van Engels slijkgras  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Spartinetum townsendii* Corillion 1953
8. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Schorrezoutgras en Lamsoor  
Kommen en schorrand  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Triglochin maritima* en *Limonium vulgare*
9. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Schorrezoutgras en Lamsoor  
*Puccinellietum maritimae typicum*, initiale fase met *Spartina anglica* Dijkema 1982 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Triglochin maritima* en *Limonium vulgare*
10. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde  
Kommen, schorrand, oeverwal en gebied langs dijk  
*Puccinellietum maritimae typicum* terminale fase met *Halimione portulacoides* Beeftink 1962

11. Overgang tussen de gemeenschap van Zeealsem en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Oeverwal, gebied langs dijk en schorrand  
*Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
12. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde, de gemeenschap van Gewoon kweldergras, de gemeenschap van Zeealsem en de gemeenschap van Zoutmelde  
*Puccinellietum maritimae typicum*, terminale fase met *Halimione portulacoides*, Beeftink 1962, *Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Halimionetum portulacoidis* Kuhnholz-Lordat 1927
13. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zilte rus  
Schorrand en gebied langs dijk  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, met *Juncus gerardii*
16. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek  
Schorrand, dam en oeverwal  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
- \* Zilte rus (*Juncus gerardii*)



## 8 Biezelingse Ham

- 1/2. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Hoog slik en primair schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
3. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeekraal  
Hoog slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Suaeda maritima*
4. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Engels slijkgras  
Intensief beweid schor  
*Puccinellietum maritimae typicum*, initiale fase met *Spartina anglica*  
Dijkema 1982
5. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gerande schijnspurrie en  
Melkkruid  
Intensief beweid schor  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, met *Spergularia maritima*  
en *Glaux maritima*
6. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek  
Dijkvoet  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962

## 9 Schor voor de Hellegatpolder

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor en lage kommen  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
  2. Gemeenschap van Engels slijkgras met Schorrekruid  
Lage kommen in overgangsgebied tussen schor en slik  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Suaeda maritima*
  3. Gemeenschap van Engels slijkgras met Schorrezoutgras  
Kommen en hoge rand  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Triglochin maritima*
  5. Gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Kommen  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
  6. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gewone zoutmelde  
Kom en hoge rand  
*Puccinellietum maritimae typicum*, terminale fase met *Halimione portulacoides* Beeftink 1962
  7. Gemeenschap van Gewoon Kweldergras met Zeeweegbree  
Kom in overgangsgebied tussen schor en slik  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Plantago maritima*
  8. Gemeenschap van Zeealsem  
Kommen, oeverwallen en schorrand  
*Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962
  9. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek met Gewone Zoutmelde  
Kom  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Atriplex prostrata*
  10. Gemeenschap van Zeealsem overgang naar de gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek  
Hoge kommen  
*Artemisietum maritimae typicum* Beeftink 1962 en *Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
  11. Gemeenschap van Strandkweek en Spiesmelde  
Hoge kom en dam  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
  12. Gemeenschap van Strandkweek met Smalbladige rolklaver  
Ogespoten gebied  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Lotus tenuis*
- \* Riet en Zeebies (*Phragmites australis* en *Scirpus maritimus*)

## 10 Schor voor de Emanuelpolder

1. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeekraal  
Primair schor  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953, variant met *Salicornia europaea*
2. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953
3. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Intensief beweide kommen en gebied langs dijk  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947
4. Gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Intensief beweide schor langs de dijk  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947
5. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras, de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Schorrezoutgras  
Intensief beweide schor langs de dijk  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, **Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Triglochin maritima-sociatie** Beeftink 1965
6. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Lage kommen  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947
7. Gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster, vaak in mozaïek met de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek  
Middelhoge kommen  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947 en **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, variant met *Aster tripolium*, en **Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Atriplici-Agrophyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
8. Mozaïek van de gemeenschap van Schorrezoutgras en de gemeenschap van Schorrezoutgras met Zeeweegbree  
Hoge kommen  
**Triglochin maritima-sociatie** Beeftink 1965 en **Triglochin maritima-sociatie** Beeftink 1965, variant met *Plantago maritima*
9. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek  
Hoge kommen  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, variant met *Aster tripolium* en **Atriplici-Agrophyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962

10. Mozaïek van de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek met Zeeaster, de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek en de gemeenschap van Schorrezoutgras  
Schorranden  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962,  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Aster tripolium* en *Triglochin maritima*-sociatie Beeftink 1965
11. Mozaïek van de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek, de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek met Zeeaster, de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Schorrezoutgras  
Begreppeld schor met oeverwallen  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962,  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 variant met *Aster tripolium*, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Triglochin maritima*-sociatie Beeftink 1965
13. Mozaïek van de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek met Zeebies  
Oeverwallen en overgang schorrand-kom  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 en  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Scirpus maritimus*
14. Gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek  
Oeverwallen en dammen  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
- \* Riet en Zeebies (*Phragmites australis* en *Scirpus maritimus*)

# 11 Schor voor de Zimmermanpolder en 12 Schor bij Bath

1. Gemeenschap van Engels slijkgras  
Primair schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
2. Gemeenschap van Engels slijkgras met Zeeaster  
Primair schor  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, met *Aster tripolium*
3. Gemeenschap van Zeeaster  
Kommen  
*Aster tripolium*-sociatie Beeftink 1965
4. Gemeenschap van Zeeaster en de gemeenschap van Engels slijkgras  
Schorren  
*Aster tripolium*-sociatie Beeftink 1965 en *Spartinetum townsendii*  
Corillion 1953
5. Gemeenschap van Zeebies met de gemeenschap van Engels slijkgras  
Kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941 en  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953
6. Gemeenschap van Zeebies  
Schorranden  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941
7. Gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde  
Kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941,  
variant met *Atriplex prostrata*
- 8/9. Gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde en de gemeenschap van Gewoon  
kweldergras  
Kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941,  
met *Atriplex prostrata* en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
10. Gemeenschap van Engels slijkgras met Spijesmelde  
Kommen  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Atriplex prostrata*
11. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster  
Overgang van dijkvoet naar kommen en oeverwallen  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Aster*  
*tripolium*
12. Gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek met Rood zwenkgras  
Plaatselijk langs de schorrand  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met  
*Festuca rubra*

13. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Schorrezoutgras  
Schorrand, kommen en bekaad schor  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Triglochin maritima*
14. Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek en de gemeenschap van Zeebies  
Schor  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 en  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941
15. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Fioringras  
Kommen  
*Puccinellietum maritimae agrostidetosum* Beeftink 1962
- 16/ Gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek
17. Oeverwallen en dijkvoet  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962
18. Gemeenschap van Gewoon kweldergras met Gerande schijnspurrie  
Vergraven schor  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Spergularia maritima*
19. Gemeenschap van Riet  
Kommen  
*Phragmites communis-consociatie* Beeftink 1965
20. Gemeenschap van Schorrezoutgras  
Schorranden  
*Triglochin maritima-sociatie* Beeftink 1962
21. Mozaïek van de gemeenschap van Zeeaster met de gemeenschap van Zeeaster  
met Engels slijkgras  
Kommen  
*Aster tripolium-sociatie* Beeftink 1965 en *Aster tripolium-sociatie*  
Beeftink 1965, variant met *Spartina anglica*
22. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras met Zeeaster en de  
gemeenschap van Zeebies  
Schorranden en kommen  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, variant met *Aster tripolium* en  
*Halo-Scirpetum maritimi* Dahl et Hadač 1941
23. Mozaïek van de gemeenschap van Zeeaster en de gemeenschap van Zeebies  
Kommen  
*Aster tripolium-sociatie* Beeftink 1965 en *Halo-Scirpetum maritimi* Dahl  
et Hadač 1941
24. Mozaïek van de gemeenschap van Zeeaster, de gemeenschap van Zeeaster  
met Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeebies  
Kommen  
*Aster tripolium-sociatie* Beeftink 1965, *Aster tripolium-sociatie* Beef-  
tink 1965, variant met *Spartina anglica* en *Halo-Scirpetum maritimi* Dahl  
et Hadač 1941

25. Mozaïek van de gemeenschap van Zeeaster en de gemeenschap van Engels slijkgras met Spiesmelde  
Schorren  
**Aster tripolium-sociatie** Beeftink 1965 en **Spartinetum townsendii**  
Corillion 1953, variant met *Atriplex prostrata*
26. Mozaïek van de gemeenschap van Zeeaster met Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeebies met Engels slijkgras  
Schorren  
**Aster tripolium-sociatie** Beeftink 1965, variant met *Spartina anglica* en  
**Halo-Scirpetum maritimi** Dahl et Hadač 1941, variant met *Spartina anglica*
28. Mozaïek van de gemeenschap van Spiesmelde en Strandkweek met Zeebies en de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Fioringras  
Kommen  
**Atriplici-Agropyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962, variant met  
*Scirpus maritimus* en **Puccinellietum maritimae agrostidetosum** Beeftink  
1962

### 13 Schor van Ossendrecht

1. Overgang van de gemeenschap van Engels slijkgras naar de gemeenschap van Zeebies  
Primair schor en in kreken  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, overgang naar  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941
  2. Gemeenschap van Zeebies  
In kreken en lage schorrand  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941
  3. Gemeenschap van Zeebies met Echt lepelblad  
Lage en middelhoge schorrand  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, variant met *Cochlearia officinalis*
  4. Gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde, Echt lepelblad en Gewoon kweldergras  
Hoge kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, variant met *Atriplex prostrata*, *Cochlearia officinalis* en *Puccinellia maritima*
  5. Gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde  
(Hoge) kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, variant met *Atriplex prostrata* dominant
  6. Gemeenschap van Riet met Strandkweek  
(Lage) kommen en opgespoten gebied  
*Phragmites communis-consociatie* Beeftink 1965, variant met *Elymus pycnanthus*
  7. Gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek met Zeebies  
Hoge kommen en dam  
*Atriplici-Agrophyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, variant met *Scirpus maritimus*
- 8/9/10/11/13/14/15/16/17  
Gemeenschap van Spijesmelde en Akkerdistel met eventueel Spijesmelde, Haagwinde, Akkermelkdistel, Duinriet en de overgang van deze gemeenschap naar gemeenschappen uit de klasse der zandige droge graslanden  
Sterk antropogeen beïnvloede terreinen, vloedmerkzone  
*Atriplici-Cirsietum arvensis* Beeftink 1965, met *Atriplex prostrata* en *Calystegia sepium*, *Sonchus arvensis*, *Calamagrostis epigejos* en de overgang naar de klasse *Koelerio-Corynephoretea* Klika apud Klika et Novák 1941
- A Antropogeen, vnl. opgespoten terrein



## 14 Verdrongen Land van Saeftinghe

1. Gemeenschap van Engels slijkgras.  
Slik, op- en aanwassen.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953
2. Gemeenschap van Zeekraal.  
Slik, op- en aanwassen.  
**Salicornietum strictae** Christiansen 1955
5. Mozaïek van de gemeenschap van Zeekraal gemeenschap van Engels slijkgras.  
Laag schor en schorrand.  
**Aster tripolium-sociatie** Beeftink 1965 en **Spartinetum townsendii** Corillion 1953
6. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde.  
Complex van lage natte kommen en vrij hoge oeverwallen en hogere komdelen.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941 variant met *Atriplex prostrata*
7. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Zeebies met Spijesmelde en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek.  
Complex van minder natte kommen, vrij hoge oeverwallen en hogere komdelen.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941 variant met *Atriplex prostrata* en **Atriplici-Agropyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
- 7a. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Spijesmelde en de gemeenschap van Spijesmelde en Strandkweek.  
Complex van minder natte kommen en vrij droge gebieden met flinke oeverwallen.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947 variant met *Aster tripolium* en **Atriplici-Agropyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
9. Gemeenschap van Zeebies.  
Oostelijke kuststrook; uitwateringsluisjes.  
**Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941

11. Mozaïek van de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en Spiesselde en de gemeenschap van Schorrezoutgras.  
Hoge overwegend droge kommen.  
**Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947 variant met *Aster tripolium* en *Atriplex prostrata* en **Triglochin maritima-sociatie** Beeftink 1965
- 11a. Overgang tussen de gemeenschap van Zeebies en de gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
**Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941 en **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947
12. Mozaïek van de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Zeebies met Spiesselde, de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek.  
Complex van hoge natte kommen.  
**Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, variant met *Atriplex prostrata*, **Spartinetum townsendii** Corillion 1953 en **Atriplici-Agrophyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
- 12a. Mozaïek van de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en Spiesselde en de gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek.  
Complex van hoge natte kommen en vrij droge gebieden met flinke oeverwallen.  
**Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Spartinetum townsendii** Corillion 1953, **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, variant met *Aster tripolium* en *Atriplex prostrata* en **Atriplici-Agrophyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
13. Overgang tussen de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en Spiesselde, de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek.  
Complex van vrij hoge, overwegend droge kommen en brede oeverwallen.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, variant met *Aster tripolium* en *Atriplex prostrata* en **Atriplici-Agrophyretum pungentis** Beeftink et Westhoff 1962
14. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Schorrezoutgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
Complex van hoge natte kommen en vrij hoge gebieden.  
**Spartinetum townsendii** Corillion 1953, **Halo-Scirpetum maritimi** (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, **Triglochin maritima-sociatie** Beeftink 1965 en **Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947
15. Gemeenschap van Riet  
Kommen  
**Phragmites communis-consociatie** Beeftink 1965

17. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en Spiesselde, gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek, gemeenschap van Zeebies en restanten van de gemeenschap van Zilte rus, met Rood zwenkgras en Melkkruid.  
Vrij droge gebieden met flinke oeverwallen, gedeeltelijk met restanten van vroegere beweiding.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 variant met *Atriplex prostata* en *Aster tripolium*, *Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962, *Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941 en *Juncetum gerardii inops* Dijkema 1982, variant met *Festuca rubra* en *Glaux maritima*.
  
18. Gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek en de gemeenschap van de gemeenschap van Zeebies.  
Vrij hoge oeverwallen en hogere komdelen.  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 en *Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941
  
19. Gemeenschap van Spiesselde en Strandkweek met Zilte rus, Rood zwenkgras en Melkkruid.  
Oeverwallen met restanten van vroegere beweiding.  
*Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 met *Juncus gerardii*, *Festuca rubra* en *Glaux maritima*
  
20. Gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
Min of meer geexponeerde schorrand.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
  
22. Mozaïek van de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
Hoge natte kommen, extensief beweid door schapen.  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, *Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
  
24. Gemeenschap van Schorrezoutgras.  
Hoge weke kommen. Intensief beweid door schapen.  
*Triglochin maritima-sociatie* Beeftink 1965
  
25. Gemeenschap van Zeebies met Spiesselde  
Hoge natte kommen, met sporen van vroegere beweiding.  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, variant met *Atriplex prostrata*
  
26. Mozaïek van de gemeenschap van Zeebies, de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Schorrezoutgras.  
Kommen  
*Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Triglochin maritima-sociatie* Beeftink 1965
  
27. Gemeenschap van Gewoon kweldergras (in het oostelijk deel met de gemeenschap van Fioringras.  
Regelmatig gemaaide kwelder.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en (*Agrostis stolonifera salina-sociatie* Beeftink 1962)

28. Gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras  
Hoge moerassige kommen door rundvee begraasd  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
- 28a. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Zeekraal  
Complex van hoge moerassige kommen met door rundvee kapot gelopen vegetatie, met kale plekken en poelen.  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Salicornietum strictae* Christiansen 1955
29. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras en de gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
Door rundvee beweide kwelder.  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953 en *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
- 29a. Mozaïek van de gemeenschap van Engels slijkgras, de gemeenschap van Zebies, de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Fioringras.  
Door paarden en rundvee intensief beweide kwelder.  
*Spartinetum townsendii* Corillion 1953, *Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Agrostis stolonifera salina-sociatie* Beeftink 1962
30. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Fioringras.  
De laatste 25 jaren door paarden en runderen intensief beweide kwelder.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Agrostis stolonifera salina-sociatie* Beeftink 1962
32. Gemeenschap van Gewoon kweldergras.  
Door schapen intensief beweide droge kwelder.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947
- 32a. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Sâhorrezoutgras.  
Door schapen intensief beweide droge kwelder.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947 en *Triglochin maritima-sociatie* Beeftink 1965
- 32b. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras, de gemeenschap van Gewoon kweldergras met Zeeaster en Spiesmelde, de gemeenschap van Strandkweek en de gemeenschap van Zebies.  
Complex van vrij droge door schapen intensief beweide kwelders met brede oeverwallen.  
*Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, *Puccinellietum maritimae typicum* Westhoff 1947, variant met *Aster tripolium* en *Atriplex prostrata*, *Atriplici-Agropyretum pungentis* Beeftink et Westhoff 1962 en *Halo-Scirpetum maritimi* (Van Langendonck 1931) Dahl et Hadač 1941

34. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras en de gemeenschap van Zilte rus met Rood zwenkgras en Melkkruid.  
Hoge kwelder met sporen van vroegere beweiding.  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947 en **Juncetum gerardii inops** Dijkema 1982 variant met *Festuca rubra* en *Glaux maritima*
37. Mozaïek van de gemeenschap van Gewoon kweldergras, de gemeenschap van Zilte rus met Rood zwenkgras en Melkkruid en de gemeenschap van Zeeweegbree.  
Complex van oeverwallen en kommen met vluchtheuvels, door rundvee intensief beweid.  
**Puccinellietum maritimae typicum** Westhoff 1947, **Juncetum gerardii inops** Dijkema 1982, variant met *Festuca rubra* en *Glaux maritima* en **Plantagini-Limonietum** Westhoff et Segal 1961

A Antropogeen

Bijlage 4. Technische gegevens: vliegdatum luchtfoto's, datum veldwerk, aantal gemaakte vegetatieopnamen per gebied en archiefnummers gebiedskaarten.

GEBIED (+ nummer)	LUCHTFOTO'S	VELDWERK	AANTAL OPNAMEN	ARCHIEFN.R. DGW
1. Rammekenskoek	aug 1982	aug/okt '82	205	4.83M150
2. Kaloot	juni 1983	aug 1983	78	4.86M290
3. Hooge Platen	juni 1983	aug 1983	18	4.86M289
4. Schor bij Hoofdplaat	aug 1982	sept 1982	} 183	4.86M154 t/m
5. Schor voor de Paulinapolder	aug 1982	sept 1982		4.86M156
6. Zuidgors	aug 1982	sept/okt 1982	155	4.86M151
7. Schor bij Baarland	aug 1982	sept 1982	120	4.86M151
8. Biezelingse Ham	aug 1982	sept 1982	16	4.86M153
9. Schor voor de Hellegatpolder	aug 1982	sept/okt 1982	77	4.86M152
10. Schor voor de Emanuelpolder	juni 1980	aug/sept 1982	162	4.82M057
11. Schor voor de Zimmermanpolder	juni 1980	aug 1980	} 121	4.82M278
12. Schor bij Bath	juni 1980	aug 1980		4.82M278
13. Schor van Ossendrecht	aug 1982	sept/okt 1982	122	4.83M149
14. Verdronken Land van Saeftinghe	juli 1979	aug/sept 1979	224	4.83M100



Bijlage 5. Korte karakteristieken van de gekarteerde gebieden

	opp. (ha) *	eig. dom	be- heer- der	be- heer	nat. besch. status	korte beschrijving/gebruik	erosie/ aangr. (1)	oever- verde- diging
1. Schor bij Rammekenshoek	44	part	part	N	.	oost: rest schor en slik; resten vroegere landaan- winningswerken; bedreigd door haven/ind. activiteiten; west: strand en duintjes, deels opgespoten (caissons); recreatie	#	-
2. Kaloot	9	Dom	Dom	N	.	deels opgespoten; ten W be- grend door laag duingebied; leidingen + geleidedammen tbv kerncentrale Borssele; overal crossactiviteiten; in duintjes recreatie	-	-
3. Hooge Platen	7,5	Dom	ZL	N/V	.	vrij recente en nog labiele opwassen; de twee oostelijke met Spartina, de westelijke met enige kunstmatige duinvor- waarop de grootste dwergstern- kolonie van Nederland	-	-
4. Schor bij Hoofdplaat	5	Wat	Wat	N	.	klein schor in voormalige polder (met resten dijk); werkstrook tbv dijkver- zwarend nog goed zichtbaar; schorontwikkeling in voor- malige havenkom	#	-
5. Schor voor de Paulinapolder	60	Part/ Dom/ZL	Part/ ZL	N	.	west: sterk door erosie be- dreigd schor met veel schapen- dammen; oost: rest opgespoten zand waarop duinvorming;recreatie	@@@	-
6. Zuidgors	71	Nat	Nat	N	.	schor met schapendammen; W deel sterk erosief	@@@ (W)	-
7. Schor bij Baarland	11	Nat/ Wat	Nat/ Wat	S	.	door erosie bedreigd schor; brede werkstrook tbv dijkver- zwarend goed zichtbaar; kleiwinning	@@@	+
8. Biezelingse Ham	4	Wat	Wat	N/S	.	laag schor bestaande uit 2 delen; klein deel duintjes (Z) alwaar recreatie; in N afwateringsgeul gemaal	@@(O)	-
9. Schor voor de Hellegatpolder	24	Dom/ part?	Dom/ part?	N	.	verruigd schor met veel res- ten schapendammen; O deel op- gespoten?; veel recreatie	-	-
10. Schor voor de Emanuelpolder	107	SBB	SBB	N/S	BN	schor met schapendammen; O begreppeld; op slik sporen van vroegere veenwinning	@@@ (W)	-
11. Schor voor de Zimmermanpolder	32,5	SBB	SBB	N	.	sterk door erosie bedreigd schor	@@@	-
12. Schor bij Bath	26,5	SBB	SBB	N	.	sterk door erosie bedreigd schor	@@@	-
13. Schor van Ossendrecht (Appelzak)	16,5	Dom	Dom	N	.	deels opgespoten terrein; enige vindplaats in ZW-Neder- land van Cochlearia anglica	@@	-
14. Verdronken Land van Saeftinghe	2770	Dom/ part	ZL/ part	R/P/S	BN	grootste aaneengesloten schor en slikgebied in ZW-Nederland; horizontale milieugradiënt	@(W)+ @@@(O)	-

\* opp. betreft de begroeide gebieden incl kreken

eigendom/: Dom Domeinen  
beheerder Nat Natuurmonumenten  
part particulier  
SBB Staatsbosbeheer  
Wat Waterschap  
ZL Zeeuws Landschap

NB eigendom/beheerder is zeer complex en veranderlijk

beheer: N niets doen  
P beweid door paarden  
R beweid door runderen  
S beweid door schapen  
V vastleggen en vorming  
duintjes

status: BN beschermd natuurgebied  
in het kader van de Natuur-  
beschermingswet; alle gebieden  
een planologische bestemming  
als natuurgebied

erosie: @ gering  
@@ matig  
@@@ aanzienlijk

aangroei: # gering

(1) zie ook tabel 2  
(O) oostelijk deel  
(W) westelijk deel

oeververdediging: + aanwezig



